

*Los ingredientes de la leche proceden de leche de vacas no tratadas con rBST que no es diferente de la leche de vacas tratadas con rBST.

NUTRIENTES por cada 100 calorías (4.5 fl oz, si se prepara como se indica)

PROTEÍNA	2.8 g	AGUA	120 g
GRASA	5.5 g	ÁCIDO LINOLEICO	750 mg
CARBOHIDRATO	10.1 g		

VITAMINAS

VITAMINA A	350 UI	NIACINA	1950 mcg
VITAMINA D	70 UI	ÁCIDO FÓLICO (FOLACINA)	25 mcg
VITAMINA E	3.6 UI	ÁCIDO PANTOTÉMICO	800 mcg
VITAMINA K	11 mcg	BIOTINA	9 mcg
TIAMINA (MT. B.)	175 mcg	VITAMINA C (ÁCIDO ASCÓRBICO)	15 mg
RIBOFLAVINA (VT. B.)	150 mcg	COLINA	16 mg
VITAMINA B ₆	100 mcg	INOSITOL	35 mg
VITAMINA B ₁₂	0.40 mcg		

MINERALES

CALCIO	105 mg	COBRE	120 mcg
FÓSFORO	62 mg	YODIO	15 mcg
MAGNESIO	9 mg	SELENO	2.3 mcg
HIERRO	1.8 mg	SODIO	33 mg
ZINC	1.2 mg	POTASIO	142 mg
MANGANESO	10 mcg	CLORURO	75 mg

INGREDIENTES: LECHE DESCREMADA, SÓLIDOS DE JARABE DE MAÍZ, LACTOSA, ACEITE DE SOJA, ACEITE DE CARTAMO DE ALTO CONTENIDO OLEICO, CONCENTRADO DE PROTEÍNA DE SUERO DE LECHE, TRIGLICÉRIDOS DE CADENA MEDIA, ACEITE DE COCO, **MENOS DEL 2 % DE:** ACEITE DE SCHIZOCHYTRIUM SP.,¹ ACEITE DE M. ALPINA,² BETACAROTENO, LUTEÍNA, CITRATO DE POTASIO, FOSFATO DE CALCIO, INOSITOL, ÁCIDO ASCÓRBICO, CLORURO DE MAGNESIO, LECITINA DE SOJA, CARBONATO DE CALCIO, TAURINA, SULFATO FERROSO, BITARTRATO DE COLINA, CLORURO DE COLINA, PALMITATO DE ASCORBILLO, L-CARNITINA, CLORURO DE POTASIO, SULFATO DE ZINC, TOCÓFEROLES MIXTOS, ACETATO DE D-ALFA-TOCÓFERILO, CITRATO DE SODIO, NIACINAMIDA, PANTOTENATO DE CALCIO, SULFATO CÚPRICO, PALMITATO DE VITAMINA A, CLORHIDRATO DE TIAMINA, RIBOFLAVINA, CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA, ÁCIDO FÓLICO, SULFATO DE MANGANESO, FILOQUINONA, BIOTINA, SELENATO DE ZINC, VITAMINA D₃, VITAMINA B₁₂, YODURO DE POTASIO, HIDRÓXIDO DE POTASIO Y NUCLEÓTIDOS (5'-MONOFOSFATO DE ADEOSINA, 5'-MONOFOSFATO DE CITIDINA, 5'-MONOFOSFATO DISÓDICO DE GUANOSINA, 5'-MONOFOSFATO DISÓDICO DE URIDINA). **CONTIENE INGREDIENTES DE LECHE Y SOJA.**

Abbott Nutrition, Abbott Laboratories
Columbus, Ohio 43219-3034 EE. UU.

¹FUENTE DE DHA.
²FUENTE DE ARA.

USAR ANTES DE LA FECHA QUE SE INDICA EN LA LATA • USAR SEGÚN LAS INDICACIONES DE UN MÉDICO • Instrucciones de preparación y uso

La salud de su bebé depende de que usted siga cuidadosamente estas instrucciones. Cuando se prepara la fórmula infantil, es importante seguir procedimientos adecuados de higiene, manipulación y almacenamiento. Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse graves daños. Consulte con el médico de su bebé cuál es la fórmula adecuada para su bebé; pregúntele si debe usar agua hervida y enfriada para realizar la mezcla y si necesita hervir (esterilizar) los utensilios, los biberones, los chupetes y los anillos antes de utilizarlos.

Lave sus manos, las superficies de trabajo y los utensilios



Agregue 1 medida al ras sin comprimir (9.6 g) por cada 2 fl oz de agua



Tape el biberón, agítelo bien y colóquele el chupete limpio



Vierta agua en un biberón limpio (consulte la guía de preparación)

Vuelva a colocar la cuchara seca en la lata

Una vez que comience a alimentar al bebé, use la preparación dentro de la hora siguiente o deséchela

Almacenamiento

Después de mezclar, conserve inmediatamente los biberones en el refrigerador y úselos para alimentar a su bebé dentro de las 24 horas siguientes. Almacene la lata sin abrir o abierta a temperatura ambiente; evite las temperaturas extremas. Utilice el contenido de la lata dentro del mes de abierta.

Advertencia

Las fórmulas infantiles en polvo no son estériles y pueden usarse para alimentar a bebés prematuros o bebés que pudieran tener problemas inmunitarios únicamente como lo indique el médico de su bebé. Nunca utilice el horno microondas para calentar la fórmula. Podría provocar quemaduras graves.

GUÍA DE PREPARACIÓN

Mida el agua



Añada cucharadas al ras de polvo, sin presionar, con la cuchara provista

2 fl oz	1 cucharada (9.6 g)
4 fl oz	2 cucharadas
6 fl oz	3 cucharadas
8 fl oz	4 cucharadas

Cada cucharada añade aproximadamente 0.2 fl oz a la cantidad de fórmula preparada.

Para consultar instrucciones de mezcla en cantidades mayores, visite www.Similac.com/mixinginfo

Cuando se prepara como se indica, rinde aproximadamente 87 fl oz de fórmula.

Se recomienda la leche materna. Si decide alimentar a su bebé con fórmula infantil, los fabricantes de Similac® tienen una fórmula adecuada para su bebé.

¿Tiene preguntas relacionadas con el producto? Llame al 1-800-515-7677, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m., hora del este, en días laborables. www.Similac.com

Pat. www.abbott.us/patents
© 2025 Abbott Laboratories 57430 C9835-09

Similac
FeedingExpert
800-986-8800
FeedingExpert.com

Apoyo nutricional en vivo de nuestro equipo de expertos en alimentación. Consulte con el médico de su bebé antes de cambiar de fórmula.

SIN GLUTEN

ESCANEE EL CÓDIGO QR EN LA TAPA PARA VER LAS INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL

MARCA

#1

PARA LA ALIMENTACIÓN EN HOSPITALES



SIN OLEÍNA DE PALMA

SIN HORMONAS DE CRECIMIENTO ARTIFICIALES*

Similac
NEOSURE

Para bebés nacidos prematuramente
Nutrición enriquecida[†]

0-12 MESES

POLVO A BASE DE LECHE

FÓRMULA INFANTIL CON HIERRO

NUTRICIÓN CEREBRAL
DHA

SALUD OCULAR
LUTEÍNA

CRECIMIENTO Y DESARROLLO
VITAMINA E

OptiGRO®

[†]Más proteínas, vitaminas y minerales en comparación con la fórmula para bebés nacidos a término

22 CAL/FLOZ
Usar según las indicaciones de un médico

PESO NETO
13.1 OZ (371 g)

