

*El hidrolizado de caseína procede de la leche de vacas no tratadas con rBST que no es diferente de la leche de vacas tratadas con rBST.

NUTRIENTES por cada 100 calorías (5 fl oz, si se prepara como se indica)

EQUIVALENTE PROTEICO	2.75 g	AGUA	133 g
GRASA	5.54 g	ÁCIDO LINOLEICO	800 mg
CARBOHIDRATO	10.2 g		

VITAMINAS

VITAMINA A	300 UI	NIACINA	1350 mcg
VITAMINA D	60 UI	ÁCIDO FÓLICO (FOLACINA)	15 mcg
VITAMINA E	3 UI	ÁCIDO PANTOTÉMICO	750 mcg
VITAMINA K	8 mcg	BIOTINA	4.5 mcg
TIAMINA (VT. B ₁)	60 mcg	VITAMINA C (ÁCIDO ASCÓRBICO)	9 mg
RIBOFLAVINA (VT. B ₂)	90 mcg	COLINA	12 mg
VITAMINA B ₆	60 mcg	INOSITOL	5 mg
VITAMINA B ₁₂	0.45 mcg		

MINERALES

CALCIO	105 mg	COBRE	75 mcg
FÓSFORO	75 mg	YODO	15 mcg
MAGNESIO	7.5 mg	SELENIO	2 mcg
HIERRO	1.8 mg	SODIO	44 mg
ZINC	0.75 mg	POTASIO	118 mg
MANGANESO	8 mcg	CLORURO	80 mg

INGREDIENTES: MALTODEXTRINA DE MAÍZ (39%), HIDROLIZADO DE CASEÍNA (DERIVADO DE LA LECHE) (17%), ACEITE DE CÁRTAMO DE ALTO CONTENIDO OLEICO (9%), TRIGLICÉRIDOS DE CADENA MEDIA (9%), AZÚCAR (9%), ACEITE DE SOJA (8%), **MENOS DEL 2% DE:** 2-FUCOSILACTOSA (DERIVADA DE LA LECHE)¹, LUTEÍNA, BETACAROTENO, ACEITE DE SCHIZOCHYTRIUM SP.¹, ACEITE DE M. ALPINA¹, FOSFATO DE CALCIO, DATUM, CITRATO DE POTASIO, GOMA XANTANA, CLORURO DE MAGNESIO, MONOGLICÉRIDOS, ÁCIDO ASCÓRBICO, SAL, DICLORHIDRATO DE L-CISTINA, CARBONATO DE CALCIO, CLORURO DE POTASIO, L-TRIPTOFANO, CLORURO DE COLINA, SULFATO FERROSO, TAURINA, INOSITOL, PALMITATO DE ASCORBIL, ACETATO DE D-ALFA TOCOFERILO, SULFATO DE ZINC, L-CARNITINA, INACINAMIDA, TOCOFEROLES MIXTOS, PANTOTENATO DE CALCIO, SULFATO CÚPRICO, PALMITATO DE VITAMINA A, CLORHIDRATO DE TIAMINA, RIBOFLAVINA, CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA, ÁCIDO FÓLICO, YODURO DE POTASIO, HIDRÓXIDO DE POTASIO, FLOQUINONA, BIOTINA, SELENATO DE SODIO, VITAMINA D₃, VITAMINA B₁₂.

Abbott Nutrition, Abbott Laboratories
Columbus, Ohio 43219-3034 EE. UU.

¹2-FL PROCEDE DE LA LECHE, PERO NO CONTIENE PROTEÍNAS LÁCTEAS.

²FUENTE DE DHA. ³FUENTE DE ARA.

USAR ANTES DE LA FECHA QUE SE INDICA EN LA LATA • USAR SEGÚN LAS INDICACIONES DE UN MÉDICO • Instrucciones de preparación y uso

La salud de su bebé depende de que usted siga cuidadosamente estas instrucciones. Cuando se prepara la fórmula infantil, es importante seguir procedimientos adecuados de higiene, manipulación y almacenamiento. Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse graves daños. Pregunte al médico de su bebé si debe usar agua hervida y enfriada para realizar la mezcla y si necesita hervir (esterilizar) los biberones, los chupetes y los anillos antes de utilizarlos.

Lave sus manos, las superficies de trabajo y los utensilios



Agregue 1 medida al ras sin comprimir (8.7 g) por cada 2 fl oz de agua



Tape el biberón, agítelo bien y colóquelo el chupete limpio



Vierta agua en un biberón limpio (consulte la guía de preparación)

Vuelva a colocar la cuchara seca en la lata

Una vez que comience a alimentar al bebé, use la preparación dentro de la hora siguiente o deséchela

Almacenamiento

Después de mezclar, conserve los biberones en el refrigerador y úselos para alimentar a su bebé dentro de las 24 horas siguientes. Almacene la lata sin abrir o abierta a temperatura ambiente; evite las temperaturas extremas. Utilice el contenido de la lata dentro del mes de abierta.

Advertencia

Las fórmulas infantiles en polvo no son estériles y no deben usarse para alimentar a bebés prematuros o bebés que pudieran tener problemas inmunitarios, a menos que lo indique y lo supervise el médico de su bebé. Nunca utilice el horno microondas para calentar la fórmula. Podría provocar quemaduras graves.

GUÍA DE PREPARACIÓN

Mida el agua



Añada cucharadas al ras de polvo, sin presionar, con la cuchara provista

2 fl oz	1 cucharada (8.7 g)
4 fl oz	2 cucharadas
6 fl oz	3 cucharadas
8 fl oz	4 cucharadas

Cada cucharada añade aproximadamente 0.2 fl oz a la cantidad de fórmula preparada.

Para consultar instrucciones de mezcla en cantidades mayores, visite www.Similac.com/mixinginfo

Cuando se prepara como se indica, rinde aproximadamente 87 fl oz de fórmula.

¹Alimentum contiene una proteína láctea que se descompone en partículas pequeñas eliminando casi por completo las reacciones alérgicas en la mayoría de los bebés que son alérgicos a las proteínas de la leche de vaca.

Se recomienda la leche materna. Si decide alimentar a su bebé con fórmula infantil, los fabricantes de Similac[®] tienen una fórmula adecuada para su bebé.

¿Tiene preguntas relacionadas con el producto?

Llame al 1-800-515-7677, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m., hora del este, en días laborables.

www.Similac.com

Pat. www.abbott.us/patents

© 2025 Abbott Laboratories 64715 C9832-05

Similac
FeedingExpert
800-986-8800
FeedingExpert.com

Apoyo nutricional en vivo de nuestro equipo de expertos en alimentación.

Consulte con el médico de su bebé antes de cambiar de fórmula.

SIN GLUTEN

ESCANEE EL CÓDIGO QR EN LA TAPA PARA VER LAS INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL

MARCA

#1

PARA LA ALIMENTACIÓN EN HOSPITALES



SIN OLEÍNA DE PALMA

SIN HORMONAS DE CRECIMIENTO ARTIFICIALES*

Similac
ALIMENTUM[®]

Para las alergias alimentarias y los cólicos
Debidos a la sensibilidad a las proteínas[†]

HIPOALERGÉNICO

SOPORTE INMUNOLÓGICO

DESARROLLO CEREBRAL Y OCULAR

LUTEÍNA
2'-FL
VITAMINA E
HMO
Oligosacárido de leche materna[†]
*no proviene de la leche materna
DHA

0-12 MESES

POLVO

FÓRMULA INFANTIL CON HIERRO

PESO NETO
12.1 OZ (343 g)