

\*Los ingredientes de la leche proceden de leche de vacas no tratadas con rbST que no es diferente de la leche de vacas tratadas con rbST.

#### NO APTO PARA NIÑOS NI BEBÉS CON GALACTOSEMIA

#### NUTRIENTES por cada 100 calorías (5 oz fl, si se prepara como se indica)

PROTEÍNA.....	2.07 g	AGUA.....	133 g
GRASA.....	5.6 g	ÁCIDO LINOLEICO.....	1000 mg
CARBOHIDRATO.....	10.7 g		

#### VITAMINAS

VITAMINA A.....	300 UI	NIACINA.....	1050 mcg
VITAMINA D.....	60 UI	ÁCIDO FÓLICO (FOLACINA).....	15 mcg
VITAMINA E.....	1.5 UI	ÁCIDO PANTÓTENICO.....	450 mcg
VITAMINA K.....	8 mcg	BIOTINA.....	4.4 mcg
TIAMINA (VIT. B <sub>1</sub> ).....	100 mcg	VITAMINA C (ÁCIDO ASCÓRBICO).....	9 mg
RIBOFLAVINA (VIT. B <sub>2</sub> ).....	150 mcg	COLINA.....	24 mg
VITAMINA B <sub>6</sub> .....	60 mcg	INOSITOL.....	24 mg
VITAMINA B <sub>12</sub> .....	0.25 mcg		

#### MINERALES

CALCIÓN.....	78 mg	COBRE.....	90 mcg
FÓSFORO.....	42 mg	YODO.....	15 mcg
MAGNESIO.....	6 mg	SELENCIO.....	2 mcg
HIERRO.....	1.8 mg	SODIO.....	24 mg
ZINC.....	0.75 mg	POTASIO.....	105 mg
MANGANEZO.....	5 mcg	CLORURO.....	65 mg

INGREDIENTES: LECHE DESCREMADA, LACTOSA, ACEITE DE GRASOS DE ALTO CONTENIDO OLÉICO, CONCENTRADO DE PROTEÍNA DE SUERO DE LECHE, ACEITE DE SOJA, ACEITE DE COCO, GALACTOOLIGOSACÁRIDOS\*, MENOS DEL 2% DE ACEITE DE SCHIZOCYTRUM SP., ACEITE DE M. ALPINA, <sup>1</sup>BETACAROTENO, LUTENA, CITRATO DE POTASIO, CARBONATO DE CALCIO, ÁCIDO ASCÓRBICO, LECTINA DE SOJA, CLORURO DE MAGNESIO, SULFATO FERROSO, BITARTRATO DE COLINA, CLORURO DE COLINA, PALMITATO DE ASCORBATO, SAL, CLORURO DE POTASIO, TAURINA, INOSITOL, SULFATO DE ZINC, TOCOFEROLES MIXTOS, ACETATO DE  $\alpha$ -ALFA-TOCIFEROL, NIACINAMIDA, PANTOTENATO DE CALCIO, L-CARNITINA, PALMITATO DE VITAMINA A, SULFATO CÚPRICO, CLORHIDRATO DE TIAMINA, RIBOFLAVINA, CLORHIDRATO DE PIRODIXINA, ÁCIDO FÓLICO, SULFATO DE MANGANEZO, FILOQUIONONA, BIOTINA, SELENATO DE SODIO, VITAMINA D<sub>3</sub>, VITAMINA B<sub>12</sub>, FOSFATO DE POTASIO, YODURO DE POTASIO, HIDRÓXIDO DE POTASIO Y NUCLEÓTIDOS (5'-MONOFOSFATO DE ADENOSINA, 5'-MONOFOSFATO DE CITIDINA, 5'-MONOFOSFATO DISÓDICO DE GUANOSINA, 5'-MONOFOSFATO DISÓDICO DE URIDINA). CONTIENE INGREDIENTES DE LECHE Y DE SOJA.

Producto de Irlanda  
Abbott Nutrition, Abbott Laboratories  
Columbus, Ohio 43219-3034 EE. UU.

\*PREBIÓTICO. <sup>1</sup>FUENTE DE DHA. <sup>2</sup>FUENTE DE ARA.

#### FeedingExpert

de Similac®

La ayuda con preguntas relacionadas con la alimentación está disponible en

800-986-8800

FeedingExpert.com

Consulte con el médico de su bebé antes de cambiar de fórmula.

Similac® Advance® puede ablandar las deposiciones para que sean más parecidas a las de un bebé alimentado con leche materna.

Se recomienda la leche materna. Si decide alimentar a su bebé con fórmula infantil, los fabricantes de Similac tienen una fórmula adecuada para su bebé.

¿Tiene preguntas relacionadas con el producto?

Llame al 1-800-515-7677, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m., hora del este, en días laborables.  
[www.Similac.com](http://www.Similac.com)

Pat. www.abbott.us/patents  
© 2025 Abbott Laboratories  
55957(76) P959A6 502-442-000

SIN GLUTEN

#### USAR ANTES DE LA FECHA QUE SE INDICA EN LA LATA • USAR SEGÚN LAS INDICACIONES DE UN MÉDICO • Instrucciones de preparación y uso

La salud de su bebé depende de que usted siga cuidadosamente estas instrucciones. Cuando se prepara la fórmula infantil, es importante seguir procedimientos adecuados de higiene, manipulación y almacenamiento. Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse graves daños. Pregunte al médico de su bebé si debe usar agua hervida y enfriada para realizar la mezcla y si necesita hervir (esterilizar) los biberones, los chupetes y los anillos antes de utilizarlos.

Lave sus manos, las superficies de trabajo y los utensilios

Vierta agua en un biberón limpio (consulte la guía de preparación)

Almacenamiento

Después de mezclar, conserve los biberones en el refrigerador y úselos para alimentar a su bebé dentro de las 24 horas siguientes. Almacene la lata sin abrir o abierta a temperatura ambiente; evite las temperaturas extremas. Utilice el contenido de la lata dentro del mes de abierta.

Advertencia

Las fórmulas infantiles en polvo no son estériles y no deben usarse para alimentar a bebés prematuros o bebés que pudieran tener problemas inmunitarios, a menos que lo indique y lo supervise el médico de su bebé. Nunca utilice el horno microondas para calentar la fórmula. Podría provocar quemaduras graves.

#### GUÍA DE PREPARACIÓN

Mida el agua

2 fl oz

4 fl oz

6 fl oz

8 fl oz

Añada cucharadas al ras de polvo, sin presionar, con la cuchara provista.

1 cucharada (8.7 g)

2 cucharadas

3 cucharadas

4 cucharadas

Cada cucharada añade aproximadamente 0.2 fl oz a la cantidad de fórmula preparada.

Para consultar instrucciones de mezcla en cantidades mayores, visite [www.Similac.com/mixinginfo](http://www.Similac.com/mixinginfo)

Cuando se prepara como se indica, rinde aproximadamente 90 fl oz de fórmula.

#### MARCA

#1

PARA LA  
ALIMENTACIÓN  
EN HOSPITALES



SIN OLEÍNA DE PALMA

SIN HORMONAS DE CRECIMIENTO ARTIFICIALES\*

# Similac® ADVANCE®

Nutrición completa para el primer año de vida del bebé

NUTRICIÓN  
CEREBRAL

DHA

SALUD  
OCULAR

LUTEÍNA

CREENI  
MIENTO  
Y DESARROLLO

VITAMINA E

0-12 MESES  
POLVO A BASE DE LECHE  
FÓRMULA INFANTIL CON HIERRO  
OptiGRO®



PESO NETO  
12.4 OZ (352 g)